



Avertissements[®]

agricoles

Auvergne

ISSN : 0763 - 7756

Grandes cultures

Le 31 Octobre 1990

N° 18

CEREALES

Pucerons : Intervenir localement

Cicadelles : Présence de Psammotettix alienus dans le Val d'Allier (03)

COLZA

Charançon du bourgeon terminal : Intervenir d'urgence

CEREALES

PUCERONS et J.N.O.

★ Situation

☐ Stades

Cette année, les semis ont été retardés.

A ce jour, peu de parcelles atteignent le stade 2 feuilles (semis d'avant le 10.10). Beaucoup de semis se sont effectués à partir du 20-25 Octobre.

☐ Infestation en pucerons

Sur les parcelles au stade 2 feuilles : infestation faible, de l'ordre de 5 à 13 % de plantes colonisées, notamment en Sologne, Bocage (03).

La période actuelle, pluvieuse et ventée, est très défavorable au vol de pucerons.

☐ Tour à succion d'Orléans : le vol de Rhopalosiphum padi diminue.

☐ Pouvoir virulifère : en augmentation.

★ Préconisation

Visiter les parcelles ayant atteint le stade 2 feuilles et intervenir rapidement si le seuil de 10 % de plantes colonisées est dépassé (cas assez rare pour l'instant). Si ce niveau d'infestation n'évolue pas au bout de 10 jours, il faudra intervenir également.

Utiliser un pyréthrianoïde homologué. Surveiller aussi les jeunes céréales qui vont lever début Novembre.

CICADELLES ET MALADIES DES PIEDS CHETIFS

✪ Situation

Un réseau de piégeage à l'aide de cuvettes jaunes a été mis en place courant Octobre pour détecter la présence de *Psammotettix alienus*, la cicadelle vectrice de cette "nouvelle maladie" sur blé.

Résultats au 26.10.90 sur 8-10 jours

SAULZET (03) : 25 SAULCET (03) : 22 MEZEL (63) : 0 LES PRADEAUX (63) : 0

✪ Préconisation

Dans les secteurs de l'Allier (ST-POURCAIN-s/SIOULE et GANNAT), il convient d'être vigilant pour les parcelles levées à ce jour (assez peu cette année). Une visite s'impose par beau temps pour détecter la présence de cette cicadelle grise. Les parcelles bien exposées au Sud, près de bosquets, de haies et de talus enherbés sont à suivre de plus près.

Intervenir rapidement dans ces secteurs en cas de présence. On utilisera exclusivement l'un des 2 pyrèthrinoïdes qui ont bénéficié d'une dérogation pour cet usage jusqu'au 15.11.90 à la dose pucerons : DECIS à 0,3 l/ha et KARATE à 0,15 l/ha.

La période pluvieuse actuelle est très défavorable.

COLZA

CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL

✪ Situation

Les captures sont moins nombreuses après le 23.10.

Captures cumulées de quelques postes

HAUTE-LOIRE		ALLIER		PUY-DE-DOME	
Saint-Géron	2	Saulzet	43	Bansat	6
Vergongheon	12	St-Pourçain-s/Besbre	2	Gignat	20
		Tréteau	5	Mezel	12
		Loriges	7		

✪ Préconisation

Intervenir d'urgence.